

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)



錠	起床	朝	昼	夕	寝前
		1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

**注意事項**  
★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg (白)



錠	起床	朝	昼	夕	寝前
		1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

**注意事項**

記号 ムコスタ

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)



錠	起床	朝	昼	夕	寝前
1錠					

38.5度以上の時5時間以上あけ

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

**注意事項**

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 S N K Y O 157/157:60mg

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)



錠	起床	朝	昼	夕	寝前
1錠					

喉が痛いとき

**薬の作用**  
咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

**後発品****注意事項**

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. cefcapene pivoxil hydrochloride hydrate



錠	錠前	夕	昼	朝	起床
		1	1	1	

1日3回毎食後

## 薬の作用

感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

## 注意事項

★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. rebamipide



錠	錠前	夕	昼	朝	起床
		1	1	1	

1日3回毎食後

## 薬の作用

胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

## 注意事項

記号 ムコスタ

4日分

## 3. loxoprofen sodium hydrate



錠	錠前	夕	昼	朝	起床
1錠					

38.5度以上の時5時間以上あけ

## 薬の作用

痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

## 注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 4. dequalinium chloride



錠	錠前	夕	昼	朝	起床
1錠					

喉が痛いとき

## 薬の作用

咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

## 注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

後発品

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

錠

## 薬の作用

感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

## 注意事項

★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

錠

## 薬の作用

胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

## 注意事項

記号 ムコスタ

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

38.5度以上の時5時間以上あげ

## 薬の作用

痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

## 注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

喉が痛いとき

## 薬の作用

咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

## 後発品

## 注意事項

●かんだり、のみこんだりせず、口に口の中で徐々に溶かして下さい。

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

錠

1日3回毎食後



記号 75654/6547575mg

4日分

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

**注意事項**  
★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 2. ムコスタ錠100mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

錠

1日3回毎食後



記号 ムコスタ

4日分

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

**注意事項**

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)



起床	朝	昼	夕	寝前

1錠

38.5度以上の時5時間以上あげ



記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

**注意事項**

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)



起床	朝	昼	夕	寝前

1錠

喉が痛いとき



記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

**薬の作用**  
咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

**後発品****注意事項**

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)

(セファペン ピボキシル塩酸塩水和物錠)



錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後



記号 75654/6547575mg

4日分

## 薬の作用

感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

## 注意事項

★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、尋麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 2. ムコスタ錠100mg (白)

(レバミピド錠)



錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後



記号 ムコスタ

4日分

## 薬の作用

胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

## 注意事項

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)

(ロキソプロフェンナトリウム水和物錠)



1錠

起床	朝	昼	夕	寝前

38.5度以上の時5時間以上あげ



記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 薬の作用

痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

## 注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)

(デカリニウム塩化物トローチ)



1錠

起床	朝	昼	夕	寝前

喉が痛いとき



記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

## 薬の作用

咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

## 注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

後発品

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

**注意事項**  
★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

備考

記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

注意事項

備考

記号 ムコスタ

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

38.5度以上の時5時間以上あけ

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

備考

記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

喉が痛いとき

**薬の作用**  
咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

後発品

注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

備考

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

患者氏名 **八王子 花子** 様

受付番号

施設名 じほう総合病院

指導日 2024年10月29日

ID No. 333-444

内科

医薬品名 1. フロモックス錠75mg（白）

服用方法 1日3回毎食後

4日分



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

医薬品名 2. ムコスタ錠100mg（白）

服用方法 1日3回毎食後

4日分



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

患者氏名 **八王子 花子** 様

受付番号

施設名 じほう総合病院

指導日 2024年10月29日

ID No. 333-444

内科

医薬品名 **3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)**服用方法 **38.5度以上の時5時間以上あけ****4回分**

起床	朝	昼	夕	寝前

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

医薬品名 **4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)****後発品**服用方法 **喉が痛いとき****14回分**

起床	朝	昼	夕	寝前

**薬の作用**  
咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。



他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg（白）

	起床	朝	昼	夕	寝前	感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。
		1	1	1		

記号 75654/6547575mg

1日3回毎食後

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg（白）


	起床	朝	昼	夕	寝前	胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。
		1	1	1		

記号 ムコスタ

1日3回毎食後

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg（極薄紅）

	起床	朝	昼	夕	寝前	痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

記号 SNKY0157/157:60mg

38.5度以上の時5時間以上あけ

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」（薄青）

後発品

	起床	朝	昼	夕	寝前	咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

記号 M・S・TROPHE・/S-06

喉が痛いとき

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

記号 75654/6547575m 4日分

## 薬の作用

感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

## 注意事項

★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 2. ムコスタ錠100mg (白)

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

記号 ムコスタ 4日分

## 薬の作用

胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

## 注意事項

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)

起床	朝	昼	夕	寝前

38.5度以上の時5時間以上あけ

記号 SNKY0157/1 4回分

## 薬の作用

痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

## 注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)

起床	朝	昼	夕	寝前

喉が痛いとき

記号 M・S・TROCHE・/S- 14回分

## 薬の作用

咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

## 注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

## 後発品

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。



ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 朝

	1錠	食後	1. フロモックス錠75mg（白） 感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。
	1錠	食後	2. ムコスタ錠100mg（白） 胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。



ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 昼

	1錠	食後	1. フロモックス錠75mg（白） 感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。
	1錠	食後	2. ムコスタ錠100mg（白） 胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。



ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 夕

	1錠	食後	1. フロモックス錠75mg (白) 感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。
	1錠	食後	2. ムコスタ錠100mg (白) 胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。



ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## その他

	38.5度以上の時5時間以上あげ	1. ロキソニン錠60mg（極薄紅） 痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。
	喉が痛いとき	2. SPトローチ0.25mg「明治」（薄青） 咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかるとき、または薬局でお薬をお求めになるときはこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg（白）75654/6547575mg

【薬の作用】感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

【注意事項】★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー、急性腎障害、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血、偽膜性大腸炎、出血性大腸炎、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、紅皮症、間質性肺炎、好酸球性肺炎、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、横紋筋融解症

## 2. ムコスタ錠100mg（白）ムコスタ

【薬の作用】胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、黄疸

## 3. ロキソニン錠60mg（極薄紅）SNKYO157/157:60mg

【薬の作用】痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

【注意事項】●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

【相互作用】本剤とノルフロキサシン(バクシダールなど)を併用すると、けいれんがおこることがあります。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー、無顆粒球症、白血球減少、溶血性貧血、再生不良性貧血、血小板減少、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、急性腎障害、ネフローゼ症候群、間質性腎炎、うっ血性心不全、間質性肺炎、消化性潰瘍、消化管出血、消化管穿孔、小腸・大腸の狭窄・閉塞、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作、無菌性髄膜炎、横紋筋融解症

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青) M-S-TROCHE-/S-06

【薬の作用】咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

【注意事項】●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

### 【重大な副作用の主な症状】

\* 重大な副作用とは、起きてしまったら重症となってしまう症状もしくは疾患のことです。これらの副作用を未然に回避するために、主な副作用症状を示してありますのでご参照ください。

該当薬剤	副作用名	副作用症状
1, 2, 3	ショック	血圧低下、痙攣、皮膚等が青紫色になる、手足が冷たく青白くなる、意識障害、呼吸困難、胸内苦悶、悪心、嘔吐、顔面潮紅、咳、しゃっくり、熱感、口内異常感、そう痒感、しびれ感
1, 2, 3	アナフィラキシー	血圧低下、痙攣、皮膚等が青紫色になる、手足が冷たく青白くなる、意識障害、呼吸困難、胸内苦悶、悪心、嘔吐、顔面潮紅、咳、しゃっくり、熱感、口内異常感、そう痒感、しびれ感
1, 3	急性腎障害	浮腫、食欲不振、尿量減少、倦怠感、赤褐色尿
1, 3	無顆粒球症	発熱、咽頭痛、口内炎、悪寒、全身倦怠感、脱力、皮下出血
1, 2, 3	血小板減少	点状出血、紫斑、鼻出血、歯肉出血、顔面紅潮、悪寒、発熱
1, 3	溶血性貧血	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
1	偽膜性大腸炎	嘔気、頻回の水様性下痢、腹痛、発熱、腹部膨満感、血便
1	出血性大腸炎	突発性の腹痛、水様性便、血便、悪心、嘔吐、微熱

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

該当薬剤	副作用名	副作用症状
1, 3	中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)	高熱, 紅斑, 水疱, 口腔粘膜のただれ, そう痒感, 嘔吐, 下痢, 全身倦怠感
1, 3	皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)	発熱, 頭痛, 関節痛, 粘膜病変, 水疱, 紅斑, 口腔粘膜のただれ, そう痒感, 角膜潰瘍, 眼の充血, 全身倦怠感
1	紅皮症	顔面, 全身の紅斑, 円く膨らんだ発疹, 皮膚の剥離, 悪寒, 高熱, 全身倦怠感
1, 3	間質性肺炎	発熱, 乾性咳嗽, 呼吸困難, 肺音の異常, 息切れ
1	好酸球性肺炎	発熱, 乾性咳嗽, 呼吸困難, 息切れ, 胸痛, 喀痰
1, 3	劇症肝炎	全身倦怠感, 食欲不振, 腹痛, 黄疸, 悪心・嘔吐, 腕がはばたくように上下する, 意識障害
1, 2, 3	肝機能障害	黄疸, そう痒感, 黄褐色尿, 淡黄色便, 意識障害, 昏睡
1, 2, 3	黄疸	発熱, 発疹, 食欲不振, 嘔気, 嘔吐, 悪心, 濃色尿, 全身倦怠感, 皮膚そう痒感
1, 3	横紋筋融解症	四肢の脱力感, 腫脹, 筋肉のこわばり, しびれ, 筋痛, 歩行障害, 赤褐色尿, 無尿
2, 3	白血球減少	発熱, 咽頭痛, 倦怠感, 皮下出血
3	再生不良性貧血	発熱, 咽頭痛, 倦怠感, 点状出血, 紫斑, 鼻出血, 歯肉出血, 貧血, 筋肉痛, 口内炎, 脱力感
3	多形紅斑	紅斑, 水疱, ただれ, 発熱, 関節痛
3	急性汎発性発疹性膿疱症	紅斑, 膿疱, 浮腫, 発熱, 血管炎
3	ネフローゼ症候群	発熱, 全身性紅潮, 血尿, 倦怠感, 食欲不振, 浮腫, 乏尿, 混濁尿, 体重増加
3	間質性腎炎	発熱, 易疲労感, 発疹, 関節痛, 血尿, 倦怠感, 浮腫, 悪心, 嘔吐, 下痢, 体重減少, あくび
3	うっ血性心不全	呼吸困難, 横になると息苦しい, 体を起すと息が楽になる, 労作時の息切れ, 易疲労感, 浮腫, 動悸
3	消化性潰瘍	上腹部痛, 腹部膨満感, 粘血便, 嘔気, 食欲不振, もたれ感, 嚥下痛
3	消化管出血	食欲不振, 嘔気, 吐血, 下血, 黒色便, 貧血
3	消化管穿孔	食欲不振, 嘔気, 吐血, 下血, 黒色便, 貧血
3	小腸・大腸の狭窄・閉塞	悪心・嘔吐, 腹痛, 腹部膨満
3	喘息発作	呼吸困難, 喘鳴, 喘息発作, 気管支痙攣
3	無菌性髄膜炎	項部硬直, 発熱, 頭痛, 悪心, 嘔吐, 筋肉痛, 意識混濁

1. フロモックス錠75mg 2. ムコスタ錠100mg 3. ロキソニン錠60mg



他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

錠

1日3回毎食後

記号 75654/6547575mg

4日分

<薬の作用> 感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

<注意事項> ★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 2. ムコスタ錠100mg (白)



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

錠

1日3回毎食後

記号 ムコスタ

4日分

<薬の作用> 胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)



起床	朝	昼	夕	寝前

1錠

38.5度以上の時5時間以上あけ

記号 S N K Y O 157/157:60mg

4回分

<薬の作用> 痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

<注意事項> ●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)



起床	朝	昼	夕	寝前

1錠

後発品

喉が痛いとき

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

<薬の作用> 咽頭炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

<注意事項> ●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

薬剤師

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

じほう 五郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)

¥36.30



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

**注意事項**  
★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

後発品情報

記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg (白)

¥10.10



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

注意事項

後発品情報

記号 ムコスタ

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)

¥10.10



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

38.5度以上の時5時間以上あけ

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

後発品情報

記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)

¥5.70



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

喉が痛いとき

**薬の作用**  
咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

後発品

注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

後発品情報

記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

他の病院、診療所にかかる時、または薬局でお薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい。

ID No 333-444

受付番号

指導日 2024年10月29日

内科

## 1. フロモックス錠75mg (白)

¥36.30



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

錠

**薬の作用**  
感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。

**注意事項**  
★発熱、咳、呼吸困難、むくみ、蕁麻疹、腹痛、激しい下痢、貧血、全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

後発品情報



記号 75654/6547575mg

4日分

## 2. ムコスタ錠100mg (白)

¥10.10



起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回毎食後

錠

**薬の作用**  
胃粘液や胃粘膜の血流量を増やす作用などにより、胃粘膜の保護、修復を促して、胃潰瘍や急性・慢性胃炎を改善します。

注意事項

後発品情報



記号 ムコスタ

4日分

## 3. ロキソニン錠60mg (極薄紅)

¥10.10



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

38.5度以上の時5時間以上あけ

**薬の作用**  
痛み、炎症、発熱の原因物質ができるのを抑えて、痛みや炎症をやわらげ、熱を下げるお薬です。

注意事項

●空腹時はさけておのみ下さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなる、悪心、嘔吐、腹痛などの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

後発品情報



記号 SNKYO157/157:60mg

4回分

## 4. SPトローチ0.25mg「明治」(薄青)

¥5.70



起床	朝	昼	夕	寝前
				1錠

喉が痛いとき

**薬の作用**  
咽喉炎、扁桃炎、口内炎や抜歯創を含む口腔創傷の感染予防などに用いる抗菌薬のトローチです。

後発品

注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

後発品情報



記号 M・S・TROCHE・/S-06

14回分

患者さんへ  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師  
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。  
薬剤師

じほう 五郎

じほう総合病院  
〒101-0000 東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。