

☆ 八王子 花子

様のお薬の説明書です☆

他の病院、診療所にかかるとき、または薬局でお薬をお求めになるときはこの用紙を見せて下さい

ID No 01

受付番号20

調剤日 2011年7月25日

1. SPトローチ0.25mg「明治」(青)

Meiji Sei

(塩化デカリニウムトローチ)



1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前

薬の作用

口中の炎症を抑えたり
傷の感染予防をする抗
菌薬のトローチです。

注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中
で徐々に溶かして下さい。

記号 M・S・TROCHE・/S-06

24回分

2. ピーエイ配合錠(白～微黄白)

全星

(非ピリン系感冒剤(4)錠)



1回 2錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	2	2	2	

1日3回朝昼夕食後

薬の作用

熱、鼻水などのかぜの
症状をやわらげるお薬
です。

注意事項

●眠くなることがありますので、車の
運転や機械の操作は行わないようご注
意下さい。★アスピリンや他の解熱鎮
痛薬で喘息がでたことのある方、消化
性潰瘍、緑内障、前立腺肥大、15歳未
満で水痘やインフルエンザの方は通常
服用できません。

記号 ZE22/ZE22Y-ZP

4日分

3. ムコスタ錠100mg(白)

大塚製薬

(レバミピド錠(1))



1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回朝昼夕食後

薬の作用

胃潰瘍、胃炎のお薬で
す。

注意事項

記号 ムコスタ

4日分

4. ロキソニン錠60mg(極薄紅)

第一三共

(ロキソプロフェンナトリウム錠)



1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回朝昼夕食後

薬の作用

熱を下げ、痛みをやわ
らげ、炎症を抑えるお
薬です。

注意事項

★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息
がでたことのある方、消化性潰瘍の
方、妊娠末期の婦人は通常服用できま
せん。発熱や全身倦怠感、白目が黄色
くなるなどの症状がみられた場合に
は、ご連絡下さい。

記号 SANKY0157/157

4日分

患者さんへ
何か異常がありましたら、医師、薬剤師
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

担当者

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇 1-1

じほう 太郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。