

## 1. SPトローチ0.25mg「明治」(青) M・S・TROCHE・/S-06

【薬の作用】口中の炎症を抑えたり傷の感染予防をする抗菌薬のトローチです。

【注意事項】●かんだり、のみこんだりせずに口の中で徐々に溶かして下さい。

## 2. ピーエイ配合錠(白～微黄白) ZE22/ZE22Y-ZP

【薬の作用】熱、鼻水などのかぜの症状をやわらげるお薬です。

【注意事項】●眠くなることがありますので、車の運転や機械の操作は行わないようご注意ください。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍、緑内障、前立腺肥大、15歳未満で水痘やインフルエンザの方は通常服用できません。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー様症状、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、剥脱性皮膚炎、再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少、喘息発作、間質性肺炎、好酸球性肺炎、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、乳児突然死症候群、乳児睡眠時無呼吸発作、間質性腎炎、急性腎不全、横紋筋融解症、緑内障

## 3. ムコスタ錠100mg(白) ムコスタ

【薬の作用】胃潰瘍、胃炎のお薬です。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー様症状、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、黄疸

## 4. ロキソニン錠60mg(極薄紅) SANKY0157/157

【薬の作用】熱を下げ、痛みをやわらげ、炎症を抑えるお薬です。

【注意事項】★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息がでたことのある方、消化性潰瘍の方、妊娠末期の婦人は通常服用できません。発熱や全身倦怠感、白目が黄色くなるなどの症状がみられた場合には、ご連絡下さい。

【重大な副作用】ショック、アナフィラキシー様症状、溶血性貧血、白血球減少、血小板減少、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Leell症候群)、急性腎不全、ネフローゼ症候群、間質性腎炎、うっ血性心不全、間質性肺炎、消化管出血、消化管穿孔、肝機能障害、黄疸、喘息発作、無菌性髄膜炎

### 【重大な副作用の主な症状】

\* 重大な副作用とは、起きてしまったら重症となってしまう症状もしくは疾患のことです。これらの副作用を未然に回避するために、主な副作用症状を示してありますのでご参照ください。

| 該当薬剤    | 副作用名  | 副作用症状   |
|---------|---|---|
| 2, 3, 4 | ショック  | 血圧低下、痙攣、皮膚等が青紫色になる、手足が冷たく青白くなる、意識障害、呼吸困難、胸内苦悶、悪心、嘔吐、顔面潮紅、咳、しゃっくり、熱感、口内異常感、そう痒感、しびれ感 |
| 2, 3, 4 | アナフィラキシー様症状                                     | 口内異常感、顔面紅潮、熱感、くしゃみ、しびれ感、悪心、尿意、便意、喘鳴、皮膚等が青紫色になる、手足が冷たく青白くなる、呼吸困難、咽・喉頭浮腫              |
| 2       | 中毒性表皮壊死融解症<br>(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN) | 高熱、紅斑、水疱、口腔粘膜のただれ、そう痒感、嘔吐、下痢、全身倦怠感  |
| 2, 4    | 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)                    | 発熱、頭痛、関節痛、粘膜病変、水疱、紅斑、口腔粘膜のただれ、そう痒感、角膜潰瘍、眼の充血、全身倦怠感                                  |
| 2       | 剥脱性皮膚炎  | 顔面、全身の紅斑、円く膨らんだ発疹、皮膚の剥離、悪寒、高熱、全身倦怠感   |
| 2       | 再生不良性貧血   | 発熱、咽頭痛、倦怠感、点状出血、紫斑、鼻出血、歯肉出血、貧血、筋肉痛、口内炎、脱力感  |
| 2       | 汎血球減少   | 発熱、咽頭痛、口内炎、悪寒、全身倦怠感、脱力、皮下出血   |