

いつもと違う「注意事項」のような症状に気付いたときは、医師、看護師、薬剤師の誰かにお伝え下さい。

ID 200

男性

診療科: 内科

処方医: 八王子 太郎

全体の注意事項

Rp 1 投薬開始日 2011年07月25日 投与時間 10:00

ハイカリック液-1号 / 高カロリー輸液用基本液(5-1)

700mL1袋

×1

薬の作用
食事から栄養が十分とれない時に必要なカロリーと電解質を補う注射薬です。

注意事項
重篤なアシドーシスが発現することがあるので、必ずビタミンB1（必要量1日3mg以上を目安）を併用し、発現した場合は、直ちに100～400mgのビタミンB1製剤を急速静脈内投与します。あるいは中断し、アルカリ化剤の投与等の処置を行います。

アミノレバン点滴静注 / 肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液

200mL1袋

×1

薬の作用
肝臓障害時に必要なアミノ酸を補給する注射薬です。

注意事項

トリパレン1号輸液 / 高カロリー輸液用基本液(4-1)

600mL1袋

×1

薬の作用
食事から栄養が十分とれない時に必要なカロリーと電解質を補う注射薬です。

注意事項
重篤なアシドーシスが発現することがあるので、必ずビタミンB1（必要量1日3mg以上を目安）を併用し、発現した場合は、直ちに100～400mgのビタミンB1製剤を急速静脈内投与します。あるいは中断し、アルカリ化剤の投与等の処置を行います。

Rp 2 投薬開始日 2011年07月25日 投与時間 朝/夕

強力ネオミノファーゲンシー静注20mL / グリチルリチン・グリシ

20mL1管

×2

薬の作用
肝臓の機能を改善する注射薬です。

注意事項

アデラビン9号注2mL / 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオ

2mL1管

×2

薬の作用
ビタミンB2の注射薬です。

注意事項

患者さんへ

何か異常がありましたらすぐにご連絡ください。

じほう総合病院
〒101-0000 東京都千代田区〇〇 1-1
TEL : 03-3265-7765
担当者