

他の病院、診療所にかかるとき、または薬局でお薬をお求めになるときはこの用紙を見せて下さい

ID No 01

受付番号 20

調剤日 2011年7月25日

1. SPトローチ0.25mg「明治」(青)

記号 M・S・TROCHE・
/S-06

1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前

24回分

薬の作用


口中の炎症を抑えたり
傷の感染予防をする抗
菌薬のトローチです。

後発品

注意事項

●かんだり、のみこんだりせずに口の中
で徐々に溶かして下さい。

2. ピーエイ配合錠(白～微黄白)

記号 ZE22/ZE22Y-
ZP

1回 2錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	2	2	2	

1日3回朝昼夕食
後

4日分

薬の作用

熱、鼻水などのかぜの
症状をやわらげるお薬
です。

後発品

注意事項

●眠くなることがありますので、車の運
転や機械の操作は行わないようご注意下
さい。★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で
喘息がでたことのある方、消化性潰瘍、
緑内障、前立腺肥大、15歳未満で水痘や
インフルエンザの方は通常服用できません。

3. ムコスタ錠100mg(白)



記号 ムコスタ

1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回朝昼夕食
後

4日分

薬の作用

胃潰瘍、胃炎のお薬で
す。

注意事項

4. ロキソニン錠60mg(極薄紅)

記号 SANKY0157/
157

1回 1錠

起床	朝	昼	夕	寝前
	1	1	1	

1日3回朝昼夕食
後

4日分

薬の作用

熱を下げ、痛みをやわ
らげ、炎症を抑えるお
薬です。

注意事項

★アスピリンや他の解熱鎮痛薬で喘息が
でたことのある方、消化性潰瘍の方、妊
娠末期の婦人は通常服用できません。発
熱や全身倦怠感、白目が黄色くなるなど
の症状がみられた場合には、ご連絡下
さい。

患者さんへ

何か異常がありましたら、医師、薬剤師
にご連絡下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

担当者

じほう総合病院

〒101-0000 東京都千代田区〇〇 1-1

じほう 太郎

TEL 03-3265-7765

◆上記の薬の作用は一般的のものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。